

## Le site du ministère de la santé

[Accueil \(../inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche\)](#) | [Plan du site \(../inter/plan\\_site.jsp\)](#) | [Contact \(../inter/contactsSite.do\)](#)



# DGS-urgent

Liste de diffusion DGS-Urgent - Service pour les professionnels de la santé

[Inscription et gestion de votre compte](#)

[Fonctionnement du service](#)

[Les messages émis par le service](#)

[Le répertoire RPPS \(ex ADELI\)](#)

[Accueil \(../inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche\)](#) > [Les messages émis par le service](#) > [Les messages d'alertes \(../inter/listeMessageBuilder.do?cmd=afficherListe\)](#) > **INFORMATION SUR DES FORMES CLINIQUES ATYPIQUES DE COVID-19**

## 📢 Liste des messages d'alertes



Le **22/03/2020 19:28** Réf : **2020-INF-16** Objet :  
**INFORMATION SUR DES FORMES CLINIQUES  
ATYPIQUES DE COVID-19**

## INFORMATION SUR DES FORMES CLINIQUES ATYPIQUES DE COVID-19

Les signes cliniques les plus fréquents du Covid-19 sont ceux d'une infection respiratoire aiguë, allant de formes paucisymptomatiques ou évoquant une pneumonie, sans ou avec signes de gravité (syndrome de détresse respiratoire aiguë, voire défaillance multi-viscérale). Toutefois des formes avec symptomatologie digestive, état confusionnel, initialement non fébriles sont souvent au premier plan chez les personnes âgées. Le Conseil national professionnel de gériatrie et la Société française de gériatrie et gérontologie ont confirmé la symptomatologie atypique du Covid-19 chez les sujets âgés, indépendamment des signes respiratoires plus classiques, se traduisant par des signes digestifs (notamment diarrhée), un état confusionnel ou des chutes, une fébricule avec variations de température entre hyper et hypothermie.

Par ailleurs, le Conseil national professionnel d'ORL a constaté la recrudescence d'anosmie brutale sans obstruction nasale, parfois isolée qui pourrait être en relation avec le Covid-19. Le Conseil national professionnel d'ORL lance une étude afin de préciser les éléments de cette constatation. Il convient dans ce cadre d'être attentif aux points suivants :

- Toujours chercher ce symptôme devant un patient suspect de Covid-19 ;
- En présence d'une anosmie sans obstruction nasale et avec une agueusie, le diagnostic de Covid-19 est à considérer comme vraisemblable et ces patients doivent être de facto isolés ;
- Ne pas les traiter par corticoïdes inhalés ou per os et les lavages de nez sont décommandés, ils pourraient favoriser la dissémination virale ;
- Ce tableau clinique semble plutôt caractéristique des formes bénignes. Toutefois il semble aussi assez fréquent dans les formes graves si on recherche le symptôme.

La fiche COREB repérer et prendre en charge un patient atteint d'infection respiratoire aigüe en contexte d'épidémie CoVID-19 a été actualisée en ce sens :  
<https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/fiche-radar-covid19-med-liberale-22-mars-vf-13h.pdf>

**Source** : Direction générale de la Santé  
14, avenue Duquesne  
75007 PARIS  
Mars 2020



**Ministère des Affaires Sociales et de la Santé**

Plan du site ([../inter/plan\\_site.jsp](#))

Mentions légales ([../inter/mentions\\_legales.jsp](#))

Contact ([../inter/contactsSite.do](#))

[www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr) (<http://www.legifrance.gouv.fr>)

[www.service-public.fr](http://www.service-public.fr) (<http://www.service-public.fr>)

[www.gouvernement.fr](http://www.gouvernement.fr) (<http://www.gouvernement.fr>)

[www.france.fr](http://www.france.fr) (<http://www.france.fr>)